

Kipridsky

Vass8R02s146-150



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp584

*PR2s146-150
Kipridsky*

Kipridsky

8R2s146-150











CLOS 8 RANG 2 Souche 146-150

Désignation : Kipridsky

CHARGE : Année :

Vérison : 4.8

Assurité : 12-9.88

Mail : 0 Pour : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13

L - M - C

Vignear : 2

POPT : érig - 1/2 érig - couché

DATE : Année :

TC - G - M - P - Dim. : 17x16

dist. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

32
33
34
35

ANNEE 1988

mi

NOM Kipridsky ll

EMPLACEMENT 8 R2 s 146. 150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2											
2	2											
3	2											
4	3	1.4	5.4	4	13	27.5	31.5	3.6	4.8	8.8	12.8	12.9
5												
		Pourriture :		0	Port : enge'		Vigueur :		2 feuille			
		5.4			31.5		0		+3			+4
		+12										

ANNEE 1989

NOM Précoce d'Astrakan

EMPLACEMENT 8 R3 s 146. 150

♀ mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	8.3	13.3	0								
2	4	8.3	13.3	0								
3	4	8.3	13.3	2	3.8							
4	4	8.3	13.3	4		24.5	27.5	30.5	24.7	31.7	10.8	28.8
5	4	13.3	16.3	1			0			+2		+3
		Pourriture :		0	Mill. : 5%		Port : mi enge'		Vigueur : 4			
		De 13.3.89 - 5										

ANNEE 1989
 NOM Kipidsky B
 mi

EMPLACEMENT 8 R2 A 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X	3	20.3	23.3	4	10	24.5	30.5	5.6	31.7	7.8	14.8	4.9
2												
3	8											
4	4	20.3	23.3	3			+3			+3		+4
X												
Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : enge'		Vigueur : 2						
		D & 23.3.89 +5										

ANNEE 1990
 NOM Kipidsky
 mi

EMPLACEMENT 8 R2 A 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1/												
2	4	1.3	12.3.	0	0							
3	8											
4	2	26.1	8.3.	0								
5/		D & 12.3.90 (+3)										
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :						

ANNEE 1991

NOM Kipudsky
ni

EMPLACEMENT 8 Rg 2 s 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X 2	2			4	12	30.5	2.6 +2	4.6	138	208 +4	238	10.9 +4
X 4	2			1								
X 5												

Grappe : G - M - P Dim : 17 Compacité : L - M - C
Pour : 0 Mill : 1
Baie : TC - G - M - P Dim: 15x14
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : erige Vigueur : 1,5

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kipridsky
cl 8 R2. 146-150 (n-147)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - ~~sans~~ ^{avec} villosité

laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -

jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé

ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -

aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité

pubescente 280 - ~~sans~~ ^{avec} villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -

à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -

entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Merisures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -

duveteux 218 - cotonneux 219 - ~~sans~~ villosité pubescente 282 -

~~sans~~ ^{avec} villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -

duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -

~~sans~~ ^{avec} villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -

jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237

duveteux 238 - cotonneux 239 - ~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kipriidsky

8 R 2

s. 146-150 (s. 147)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. ^{base}

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kiprideky

8 R20-146-150 (s. 149)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kipridsky

8 R2s-146-150 (A.2)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 18 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière ^{canes} - irrégulière (dimensions 19 x 18).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

EMPLACEMENT :

Kipridsky
8 R2 146-150 (s. 1)

(unpen. fiddle)

SARMENT DE VIGNE

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : *Kipridsky*

Emplacement : *8 R2 s MB. 150*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L2 : 7 - (8) - 9
L2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - (62)
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 90